

Merja Mäkisalo-Ropponen sd

Kirjallinen kysymys pneumokokkirokotuksesta yli 65-vuotiaille

Eduskunnan puhemiehelle

Pneumokokkibakteerin aiheuttamista infektiosairauksista yksi vakavimmista on keuhkokuume, joka on viidenneksi yleisin kuolinsyy länsimaissa. Suomessa pneumokokki aiheuttaa vuosittain arviolta 10 000—13 000 keuhkokuumeetartuntaa 50 vuotta täyttäneillä. 51 prosenttia näistä keuhkokuumeetapauksista hoidetaan sairaaloissa tai terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Keuhkokuumeen sairaalahoito aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia, joiden pelätään tulevaisuudessa kasvavan edelleen. Sairaalajaksot ovat lisääntyneet, vaikka hoitojen kesto on lyhentynyt. Tämä johtuu väestön ikääntymisestä, sillä keuhkokuumeriski kasvaa voimakkaasti iän myötä. Tällä hetkellä sairaalapäiviä on noin 550 000, ja on arvioitu, että vuonna 2030 keuhkokuumeen aiheuttamia sairaalapäiviä voi olla jo lähes miljoona. Saman ennusteen mukaan keuhkokuumeetapaukset tulevat lisääntymään 25 ja hoitopäivät jopa 70 prosenttia. Tätä kasvua voidaan hillitä influenssa- ja pneumokokkirokotteiden, sovittujen hoitosuosituksen noudattamisen sekä hoitojen keskittämisen avulla.

Erityinen riski sairastua pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin, kuten keuhkokuumeeseen, aivokalvontulehdukseen ja verenmyrkytykseen, on henkilöillä, joiden immuunijärjestelmä on heikko, kuten pienillä lapsilla, yli 50-vuotiailla ja pitkäaikaissairailta. Lapset ovat saaneet pneumokokkirokotteen osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 2010 lähtien. Keuhkokuume aiheuttaa vuositasolla varovasti arvioiden noin 100 miljoonan euron välittömät kustannukset terveydenhuoltojärjestelmälle. Riskiryhmien rokottaminen voi tuoda kymmenien miljoonien eurojen laskennalliset säästöt.

Suomessa ainoastaan alle 5 prosenttia yli 50-vuotiaista on saanut pneumokokkirokotuksen, ja lähes 80 prosenttia 18—64-vuotiaista ei ole kuullutkaan pneumokokkirokotteesta. Pneumokokkirokotuskattavuuden erot kuntien välillä ovat jopa 100-kertaiset, kun taas 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotusten osalta erot ovat monin verroin pienemmät. Osa kunnista on ryhtynyt toimiin pneumokokkitietoisuuden lisäämiseksi. Muun muassa Pohjois-Karjalan Siun Sote -alueella on harkittu pneumokokkirokotusten tarjoamista alueen 64 vuotta täyttäneille asukkaille influenssarokotusten tavoin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kirjallinen kysymys KK 509/2016 vp

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä pneumokokkitietoisuuden ja pneumokokkirokotuskattavuuden lisäämiseksi yli 65-vuotiaiden ja aikuisriskiryhmään kuuluvien keskuudessa ja

aikooko hallitus hyödyntää Siun Sote -alueella pneumokokkirokotuksista saatuja kokemuksia esimerkiksi pilottihankkeen muodossa siten, että hankitaan tietoja pneumokokkirokotusten vaikutuksista tarjoamalla yli 65-vuotiaille ja aikuisriskiryhmään kuuluville pneumokokkirokote influenssarokotteen tavoin ko. alueella?

Helsingissä 4.10.2016

Merja Mäkisalo-Ropponen sd